FAUNE

DES VERTÉBRÉS DU DISTRICT D'ORBE

PAR

G. du Plessis Dr et J. Combe.

2me PARTIE. — POISSONS.

NB. Nous avons collecté les poissons dans le même rayon que le reste de la faune; notre district ne comprend que l'Orbe et ses affluents. Je citerai M. J. Combe pour toutes les espèces dont je lui dois la connaissance. Nous n'avons pas cru devoir subdiviser notre petit nombre d'espèces dans les groupes génériques récemment admis. Il y aurait eu à peine une espèce par genre et qui sait? peut-être moins encore, puisqu'on a quelquefois en zoologie mis le mâle dans un genre et la femelle dans un autre. Comme pour les reptiles, nous prendrons la notion de famille à la place de celle de genre, nous contentant de mettre en parenthèses les genres admis actuellement. *G. du P.*

a) Poissons osseux.

1re section, **Acanthoptérygiens.** — 1er groupe, **Thoraciques.**

I. PERCHES.

1. Perche fluviatile. *Perca fluviatilis*, Lin. — Commune dans toutes nos eaux courantes. Les petits ruisseaux qui se jettent

dans le marais et les fossés aboutissant à l'Orbe fourmillent au printemps de jeunes perchettes, qu'on nomme alors *vives* et qui cette année ont été décimées par une épidémie particulière.

2me groupe, **Jugulaires.**

II. CHABOTS ou CHASSOTS.

2. Chabot goujon. *Cottus gobio*, Lin. (Cuv.) — Commun sous les pierres du lit de l'Orbe et des ruisseaux clairs qui s'y jettent, Mugeon, Nozon, etc. Les pêcheurs l'appellent *chassot* ou *chasson* et s'en servent pour amorcer.

2me section, **Malacoptérygiens.** — 1er groupe, **Abdominaux.**

III. SAUMONS ou SALMONES.

3. La **Truite.** *Salmo fario*, Lin. *(Trutta fario*, Heckl. Kn.)— Commune dans le cours supérieur de l'Orbe et dans ses affluents du Jura dont l'eau, limpide et froide, coule dans des lits de sable et de cailloux. Les pêcheurs connaissent deux variétés. La *longue* et la *courte*. La première fraie toujours d'abord; elle est d'une couleur plus claire. La seconde plus foncée appartient peut-être à la variété nommée *Trutta silvatica*, Schr. La chair devient rouge dans les eaux les plus froides, lesquelles augmentent aussi le nombre des taches rouges de la peau.

4. Ombre commun. *Salmo thymallus*, Lin. *(Thymallus vexillifer*, Ag.) — On le pêche encore assez souvent dans l'Orbe, où il est fort estimé.

IV. BROCHETS ou ESOCES.

5. Brochet commun. *Esox lucius*, Lin. — Commun dans tous les fossés et tourbières, ainsi que dans les eaux de l'Orbe et de ses affluents un peu considérables. La coloration varie énormément selon l'âge, le sexe, les localités.

V. CYPRINS.

6. Carpe ordinaire. *Cyprinus carpio*, Lin. — On la prend dans les fossés du marais, où il est rare d'en voir de grandes.

7. Le **Goujon**. *Cyprinus gobio*, Lin. (*Gobio fluviatilis*, Cuv.)— Très commun dans l'Orbe et le Talent.

8. La **Tanche**. *Cyprinus tinca*, Lin. (*Tinca vulgaris*, Cuv.) — Un des poissons les plus communs du marais et qu'on trouve partout dans les fonds vaseux.

9. La **Brême**. *Cyprinus Brama*, Lin. (*Abramis Brama*, Cuv.) — Se trouve dans le canal d'Entreroches. (J. Combe.)

10. Le **Nase**. *Cyprinus nasus*, Lin. (*Chondrostoma nasus*, Ag. — Habite l'Orbe où il est devenu rare. (J. Combe.)

11. Le **Meunier** ou **Chevenne**. *Cyprinus cephalus*, Lin. (*Squalius cephalus*, s. *dobula*, Heckl.) — Très commun surtout dans les eaux de l'Orbe et du marais.

12. La **Vandoise**. *Cyprinus leuciscus*, Lin. (*Squalius leuciscus*, Heckl.) — Commune dans l'Orbe, où elle est nommée *ronzon*. (J. Combe.)

13. La **Rosse**. *Cyprinus rutilus*, Lin. (*Leuciscus rutilus*, Heckl.) — Canal d'Entreroches. (J. Combe.)

14. L'**Ablette**. *Cyprinus alburnus*, Lin. (*Alburnus lucidus*, Heckl.) — Très-commune dans l'Orbe et ses affluents. Les pêcheurs d'ici l'appellent *Vengeron*, mais il y a encore une autre espèce qui porte ce nom.

15. Le **Spirlin**. *Cyprinus bipunctatus*, Lin. (*Alburnus bipunctatus*, Heckl. Kn.) — Se trouve dans le Talent. (J. Combe.)

16. Le **Vengeron**. *Cyprinus prasinus*, Lin. (*Leuciscus prasinus*, Ag.) — Fraie en mai et remonte en troupes jusque dans le marais de Suscévaz. (J. Combe.)

17. Le **Véron**. *Cyprinus varius*, Lin. (*Phoxinus varius*, s. *lævis*, Ag.) — Dans tous les petits ruisseaux clairs et les tourbières qui en reçoivent, Mugeon, Ruz des Ouates, tourbières de Valleyres, etc.

VI. LOCHES.

18. Loche franche. *Cobitis barbatula*, Lin. — Habite les fossés tourbeux du marais d'Orny. (J. Combe.) [1]

[1] Une autre loche, le *Cobitis tænia*, habite les ruisseaux qui tombent dans le lac Léman entre Cully et Vevey.

2me groupe, **Subbranchiens.**

VII. LOTTES ou GADES.

19. Lotte commune. *Lota vulgaris*, Cuv. — Dans toutes les eaux, tant de l'Orbe que du marais.

3me groupe, **Apodes.**

VIII. ANGUILLES.

20. Anguille commune. *Muræna anguilla*, Lin. (*Anguilla vulgaris*, Flem.) — Se trouve dans l'Orbe, le Talent et le canal d'Entreroches, où elle devient de plus en plus rare.

b) Poissons cartilagineux.

X. LAMPROIES.

21. Lamproie de Planer. *Petromyzon Planeri*, Blch. (Appelée souvent *sucet* et *perce-pierres.*) — Se trouve avec sa forme de larve (*Ammocœtus branchialis*, Cuv.) à l'abreuvoir, dans un bras qui se détache de l'Orbe.